

第一章 预备知识

1 代数起源于解方程

1.1 线性方程(组)

设 a, b 是实数. 求实数 x 使得

$$ax = b.$$

- (i) $a \neq 0$, 唯一解; 轨迹是实轴上一个点.
- (ii) $a = 0, b \neq 0$, 无解.
- (iii) $a = b = 0$, 不止一个解; 轨迹是整个实轴.

设 a, b, c 是实数. 求实数 x, y 使得

$$ax + by = c.$$

- (i) a, b 不全为零, 不止一个解; 轨迹是实平面上的一条直线.
- (ii) $a = b = 0, c \neq 0$, 无解.
- (iii) $a = b = c = 0$, 不止一个解; 轨迹是整个实平面.

设 $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$ 是实数. 求实数 x, y 使得

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}.$$

- (i) 唯一解, 轨迹是实平面上两条不平行直线的交点.
- (ii) 无解.
- (iii) 不止一个解, 实平面两条重合的直线.

设 a, b, c, d 是实数. 求实数 x, y, z 使得

$$ax + by + cz = d.$$

说服自己当 a, b, c 不全为零时, 上述方程代表三维实空间的一张平面.

一般的实系数线性方程组表述如下:

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \cdots + a_{m,n}x_n = b_m \end{cases}. \quad (1)$$

它有 n 个未知数和 m 个方程.

下面我们引入矩阵来简洁地表示线性方程组. 实数上

的 m 行 n 列的矩阵是指

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix}. \quad (2)$$

对 $i = 1, 2, \dots, m$, A 的第 i 行(向量)是 $(a_{i,1}, a_{i,2}, \dots, a_{i,n})$, 记为 \vec{A}_i . 对 $j = 1, 2, \dots, n$, A 的第 j 列(向量)是

$$\begin{pmatrix} a_{1,j} \\ a_{2,j} \\ \vdots \\ a_{m,j} \end{pmatrix}.$$

记为 $\vec{A}^{(j)}$. (2) 中的矩阵可简记为 $(a_{i,j})_{m \times n}$.

注解 1.1 我们用 $O_{m \times n}$ 代表由 m 行和 n 列个 0 组成的矩阵, 称为 $m \times n$ 阶零矩阵.

例 1.2 设矩阵 A 由 (2) 给出. 则对 $i = 1, 2, \dots, m$, \vec{A}_i 是 1 行 n 列的矩阵. 对 $j = 1, 2, \dots, n$, $\vec{A}^{(j)}$ 是 m 行 1 列的矩阵. 特别地, 每个实数都是一行一列的矩阵.

矩阵 (2) 称为方程组 (1) 的系数矩阵. 而矩阵

$$B = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} & b_1 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} & b_m \end{pmatrix}.$$

称为 (1) 的增广矩阵. (1) 称为以 B 为增广矩阵的关于 x_1, \dots, x_n 的线性方程组. 如果我们说 B 是一个线性方程组的增广矩阵, 则该方程组是指 (1).

定义 1.3 如果 (1) 有解, 则称它是相容的 (*compatible*). 否则称之为不相容的. (*incompatible*). 设 (1) 相容. 如果它的解唯一, 则称之为确定的 (*deterministic*). 否则称之为不确定的 (*non-deterministic*).

例 1.4 设方程组 T_n 的增广矩阵是

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1,n} & b_1 \\ 0 & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2,n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} & b_{n-1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{n,n} & b_n \end{pmatrix},$$

其中 $a_{1,1}, a_{2,2}, \dots, a_{n,n}$ 都不等于零. 证明: T_n 是确定的.

证明. 设 T_n 对应的未知数是 x_1, \dots, x_n . 我们对 n 归纳.
当 $n = 1$ 时, T_1 是

$$a_{1,1}x_1 = b_1.$$

它的唯一解是 $x_1 = b_1/a_{1,1}$.

设 $n > 1$ 且结论对 T_{n-1} 成立. 在 T_n 中, 我们有方程 $a_{n,n}x_n = b_n$. 故 $x_n = b_n/a_{n,n}$. 将其带入到 T_n 中的前 $n-1$ 方程中, 我们得到关于 x_1, \dots, x_{n-1} 的线性方程组 U_{n-1} . 其增广矩阵为

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n-1} & b_1 - \frac{a_{1,n}b_n}{a_{n,n}} \\ 0 & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n-1} & b_2 - \frac{a_{2,n}b_n}{a_{n,n}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{n-1,n-1} & b_{n-1} - \frac{a_{n-1,n}b_n}{a_{n,n}} \end{pmatrix}.$$

则 $x_1 = \alpha_1, \dots, x_{n-1} = \alpha_{n-1}, x_n = \alpha_n$ 是 T_n 的解当且仅当 $x_1 = \alpha_1, \dots, x_{n-1} = \alpha_{n-1}$ 是 U_{n-1} 的解且 $\alpha_n = b_n/a_{n,n}$.

注意到 U_{n-1} 的系数矩阵仍为上三角形且对角线上元素都非零. 故归纳假设蕴含 U_{n-1} 的解存在且唯一. 由此可知, T_n 的解存在且唯一. 即 T_n 是确定的. \square

1.2 高次方程(组)

设 a, b, c 是实数且 $a \neq 0$, 求 x 使得

$$ax^2 + bx + c = 0.$$

配方法:

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right) \\ &= a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a} \right)^2 - \left(\frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{c}{a} \right) \\ &= a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right). \end{aligned}$$

于是, 上述一元二次方程等价于

$$\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}.$$

令 $y = x + \frac{b}{2a}$. 则

$$y^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}.$$

故求解一元二次方程等价于开平方. 我们有

$$y = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \implies x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

注解 1.5 当 $b^2 - 4ac < 0$ 时, 一元二次方程没有实数解.

设 a, b, c, d 是实数且 $a \neq 0$, 求 x 使得

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0. \quad (3)$$

令

$$x = y - \frac{b}{3a}.$$

将 y 代入等价于 (3) 的方程

$$x^3 + \frac{b}{a}x^2 + \frac{c}{a}x + \frac{d}{a} = 0$$

得

$$\left(y - \frac{b}{3a}\right)^3 + \frac{b}{a}\left(y - \frac{b}{3a}\right)^2 + \frac{c}{a}\left(y - \frac{b}{3a}\right) + \frac{d}{a} = 0.$$

化简后, 我们有

$$y^3 + py + q = 0, \quad (4)$$

其中 p, q 是实数.

注解 1.6 设

$$f(x) = x^n + \frac{a_{n-1}}{a_n}x^{n-1} + \cdots + \frac{a_1}{a_n}x + \frac{a_0}{a_n}.$$

令

$$x = y - \frac{a_{n-1}}{na_n}$$

并代入 f 得到 n 次多项式 $g(y)$. 该多项式的次高项的系数等于零.

为了求解 (4), 令

$$y = z - \frac{p}{3z}. \quad (5)$$

代入 (4) 得

$$\left(z - \frac{p}{3z}\right)^3 + p\left(z - \frac{p}{3z}\right) + q = 0.$$

展开后, 我们有:

$$z^3 - pz + \frac{p^2}{3z} - \frac{p^3}{27z^3} + pz - \frac{p^2}{3z} + q = 0.$$

化简得

$$z^6 + qz^3 - \frac{p^3}{27} = 0. \quad (6)$$

通过对方程求出 z^3 , 再通过开立方求得 y , 然后得到 x . 由此可知我们可以通过有理运算(加、减、乘、除), 开平方和开立方求出一元三次方程的根. 变换 (5) 是非平凡的, (6) 称为 (3) 的预解式 (resolvent).

一元四次方程可以通过有理运算、开平方、开立方和开四次方求解。其核心技巧也是构造预解式. 但 Abel 和 Galois 证明了一元五次方程不可能通过有理运算和开方求解。特别地, Galois 的证明催生了一门新的数学分支: 抽象代数.

求解多元高次代数方程组是代数几何的起源. 总之, 代数是可操作的几何, 几何是是描绘的代数.

2 线性方程组初步

设 L 和 L' 是两个实系数 n 元线性方程组. 如果或者 L 和 L' 都不相容, 或者 L 和 L' 有相同的实解, 则称它们是等价的. 本节的目的是把一个线性方程组化为一个等价的线性方程组, 而后者的相容性和确定性是容易判断的.

2.1 矩阵的初等行变换

设 $A = (a_{i,j})_{m \times n}$ 是 $m \times n$ 的实矩阵, $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$.

- (i) 把 A 中第 i 行和第 j 行互换位置得到矩阵 A' . 则称 A' 是通过第 I 类初等行变换由 A 得到的. 此时 A' 的第 i 行和第 j 行分别是

$$(a_{j,1}, \dots, a_{j,n}) \quad \text{和} \quad (a_{i,1}, \dots, a_{i,n}).$$

其它行与 A 相同.

- (ii) 设 $i \neq j$, α 是实数. 把 A 的第 i 行通乘 α 后加到第 j 行上得到矩阵 A' . 则称 A' 是通过第 II 类初等行变换由 A 得到的. 时 A' 的第 j 行是

$$(\alpha a_{i,1} + a_{j,1}, \dots, \alpha a_{i,n} + a_{j,n}).$$

其它行与 A 相同.

- (iii) 设 α 是非零实数. 把 A 的第 i 行通乘 α 得到矩阵 A' . 则称 A' 是通过第 III 类初等行变换由 A 得到的. 时 A' 的第 i 行是

$$(\alpha a_{i,1}, \dots, \alpha a_{i,n}).$$

其它行与 A 相同.

I、II、III 类初等行变换统称初等行变换.

引理 2.1 设 n 元线性方程组 L 的增广矩阵是 B , 对 B 进行一次初等行变换得到矩阵 B' . 再设 B' 对应的线性方程组是 L' . 则 L 与 L' 等价.

证明. 当 B' 是通过第 I 类初等行变换由 B 得到的. 则 L' 是把 L 中两个方程互换位置得到的方程组. 于是, L 和 L' 显然等价. 当 B' 是通过第 III 类初等行变换由 B 得到的. 则 L' 是把 L 中某个方程通乘一个非零实数得到的方程组. 于是, L 和 L' 等价.

下面我们考虑第二类初等变换. 设

$$B = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} & b_1 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} & b_m \end{pmatrix}.$$

则 L 是

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{i,1}x_1 + a_{i,2}x_2 + \cdots + a_{i,n}x_n = b_i \\ \vdots \\ a_{j,1}x_1 + a_{j,2}x_2 + \cdots + a_{j,n}x_n = b_j \\ \vdots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \cdots + a_{m,n}x_n = b_m \end{array} \right. .$$

而 L' 是

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{i,1}x_1 + a_{i,2}x_2 + \cdots + a_{i,n}x_n = b_i \\ \vdots \\ (\alpha a_{i,1} + a_{j,1})x_1 + (\alpha a_{i,2} + a_{j,2})x_2 + \cdots + (\alpha a_{i,n} + a_{j,n})x_n = \alpha b_i + b_j \\ \vdots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \cdots + a_{m,n}x_n = b_m \end{array} \right.$$

下面我们来证明 L 和 L' 同解. 设

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 = \beta_1 \\ x_2 = \beta_2 \\ \vdots \\ x_n = \beta_n \end{array} \right. \quad (7)$$

是 L 的一个解. 代入 L' 的第 j 个方程得

$$\sum_{k=1}^n (\alpha a_{i,k} + a_{j,k})\beta_k = \alpha \sum_{k=1}^n a_{i,k}\beta_k + \sum_{k=1}^n a_{j,k}\beta_k = \alpha b_i + b_j.$$

注意到 L 和 L' 只有第 j 个方程不同. 故 (7) 是 L' 的解.

反之, 设 (7) 是 L' 的解. 方程组 L 中只有第 j 个方程

与 L' 中不一样, 把解代入该方程得:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n a_{j,k} \beta_k &= \sum_{k=1}^n (\alpha a_{i,k} + a_{j,k} - \alpha a_{i,k}) \beta_k \\ &= \underbrace{\sum_{k=1}^n (\alpha a_{i,k} + a_{j,k}) \beta_k}_{L' \text{ 中第 } j \text{ 个方程}} - \alpha \underbrace{\sum_{k=1}^n a_{i,k} \beta_k}_{L' \text{ 中第 } i \text{ 个方程}} \\ &\stackrel{\because j \neq i}{=} \alpha b_i + b_j - \alpha b_i = b_j. \end{aligned}$$

故 (7) 也是 L 的解. \square

命题 2.2 设 n 元线性方程组 L 的增广矩阵是 B , 对 B 进行有限次初等行变换得到矩阵 B' . 再设 B' 对应的线性方程组是 L' . 则 L 与 L' 等价.

证明. 有限次利用引理 2.1 即得. \square

2.2 阶梯型矩阵

设 A 是 $m \times n$ 的实矩阵. 如果

$$A = \begin{pmatrix} 0 \cdots 0 & \bullet & * & \cdots & * & * & * & \cdots & * & * & * & \cdots & * \\ 0 \cdots 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \bullet & * & \cdots & * & * & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & & & & \vdots \\ 0 \cdots 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \bullet & * & \cdots & * \\ 0 \cdots 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & & & & \vdots \\ 0 \cdots 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

其中 \bullet 代表非零实数, $*$ 代表任意实数, 则称 A 是阶梯型矩阵. 特别地, 仅由零组成的矩阵是阶梯型的.

命题 2.3 设 A 是 $m \times n$ 的实矩阵. 通过有限次第 I 类和第 II 类初等行变换, 我们可以把 A 化为一个阶梯型矩阵.

证明. 设 A 不是零矩阵. 我们对 m 归纳. 当 $m = 1$ 时, A 本身是阶梯型的. 故命题成立. 设 $m > 1$ 且命题对 $m - 1$ 成立. 设 ℓ 列是 A 中第一个含有非零数的列, 其中一个非零数等于 a 并出现在第 k 行. 我们把第一行和第 k 行对调得到矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 0 \cdots 0 & \overset{\downarrow \ell}{a} & * \cdots * \\ 0 \cdots 0 & b_2 & * \cdots * \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 \cdots 0 & b_m & * \cdots * \end{pmatrix},$$

其中 b_2, \dots, b_m 是实数. 把第一行通乘 $-b_2 a^{-1}$ 加到第二行上得

$$C = \begin{pmatrix} 0 \cdots 0 & \overset{\downarrow \ell}{a} & * \cdots * \\ 0 \cdots 0 & 0 & * \cdots * \\ 0 \cdots 0 & b_3 & * \cdots * \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 \cdots 0 & b_m & * \cdots * \end{pmatrix},$$

类似地, 我们把第一行通乘 $-b_i a^{-1}$ 加到第 i 行上, $i = 3, 4, \dots, m$ 得

$$D = \begin{pmatrix} 0 \cdots 0 & a & * \cdots * \\ 0 \cdots 0 & 0 & * \cdots * \\ 0 \cdots 0 & 0 & * \cdots * \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 \cdots 0 & 0 & * \cdots * \end{pmatrix}.$$

设 D' 是由 D 中第二行、第三行、 \dots 、第 m 行组成得矩阵. 则 D' 有 $m - 1$ 行.

根据归纳假设, 通过有限次第 I 类和第 II 类初等行变换, 我们可以把 D' 化为一个阶梯型矩阵 D'' , 其中前 $\ell + 1$ 列中得元素都等于零. 而对 D' 做初等行变换相当于对 D 做初等行变换. 于是, 通过有限次第 I 类和第 II 类初等行变换, 我们把 D 化为阶梯矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 \cdots 0 & a & * \cdots * \\ & D'' & \end{pmatrix}. \quad \square$$

例 2.4 利用初等行变换把矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 4 \\ 4 & 2 & 4 & 10 \end{pmatrix}$$

化为阶梯型.

解.

$$A \xrightarrow{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 4 & 2 & 4 & 10 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-2r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-\frac{8}{3}r_2} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad \square$$

2.3 高斯消去法

设 L 是一个 n 元线性方程组, 其系数矩阵为 A , 增广矩阵为 $B = (A|\mathbf{b})$. 由命题 2.3 我们可以对 B 做有限次初等行变换把系数矩阵 A 化为阶梯型得到: 矩阵

$$C = \begin{pmatrix} 0 \cdots 0 & \bullet & * & \cdots & * & * & * & \cdots & * & * & * & \cdots & * & c_1 \\ 0 \cdots 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \bullet & * & \cdots & * & * & * & \cdots & * & c_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 \cdots 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \bullet & * & \cdots & * & c_k \\ 0 \cdots 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & c_{k+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 \cdots 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & c_m \end{pmatrix},$$

定理 2.5 利用上述记号. 我们有

- (i) L 相容当且仅当 $c_{k+1} = \cdots = c_m = 0$;
- (ii) L 确定当且仅当 $c_{k+1} = \cdots = c_m = 0$ 且 $k = n$.

证明. 设 L' 是以 C 为增广矩阵的 n 元线性方程组. 由命题 2.2, L' 与 L 等价. 于是, 我们只要对 L' 讨论其相容性和确定性即可.

(i) 如果 c_{k+1}, \dots, c_m 不全为零, 则 L' 不相容. 设 c_{k+1}, \dots, c_m 都等于零. 设由 \bullet 代表的非零元分别出现在第 l_1, \dots, l_k 列, 其中 $1 \leq l_1 < \dots < l_k \leq n$. 记 L' 中的未知数是 x_1, \dots, x_n . 令 $x_j = 0$, 其中 j 不等于 l_1, \dots, l_k 中的任何一个. 我们得到方程组

$$\left\{ \begin{array}{l} c_{1,l_1}x_{l_1} + c_{1,l_2}x_{l_2} + c_{1,l_3}x_{l_3} + \dots + c_{1,l_{k-1}}x_{l_{k-1}} + c_{1,l_k}x_{l_k} = c_1 \\ c_{2,l_2}x_{l_2} + c_{2,l_3}x_{l_3} + \dots + c_{2,l_{k-1}}x_{l_{k-1}} + c_{2,l_k}x_{l_k} = c_2 \\ \dots \\ c_{k-1,l_{k-1}}x_{l_{k-1}} + c_{k-1,l_k}x_{l_k} = c_{k-1} \\ c_{k,l_k}x_{l_k} = c_k, \\ 0 = 0 \\ \vdots \\ 0 = 0 \end{array} \right.$$

其中 $c_{1,l_1}, c_{2,l_2}, \dots, c_{k-1,l_{k-1}}, c_{k,l_k}$ 是非零实数. 根据例 1.4, 上述方程组相容.

(ii) 如果 $c_{k+1} = \dots = c_m = 0$ 且 $k = n$. 则 $m \geq n$ 且

得

$$B \xrightarrow{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 4 & 10 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-2r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 8 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-\frac{8}{3}r_2} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{5}{3} \end{pmatrix}.$$

根据定理 2.5, L_B 不相容.

通过对 C 做初等行变换把 L_C 的系数矩阵化为阶梯

型得

$$C \xrightarrow{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ 6 & 3 & 6 & 9 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-3r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

根据定理 2.5, L_C 相容但不确定. \square

2.4 齐次线性方程组

实系数线性方程组 H

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n = 0 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \cdots + a_{m,n}x_n = 0 \end{cases}. \quad (8)$$

称为齐次线性方程组. 显然, H 由它的系数矩阵唯一确定且 $x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_n = 0$ 是它的一个解. 称之为 H 的平凡解或零解. 故 H 必然相容.

定理 2.7 齐次线性方程组 H 有非平凡解当且仅当其系数矩阵可以通过第 I, II 类初等行变换化为

$$\left(\begin{array}{c} \left(\begin{array}{cccccccccccc} 0 & \cdots & 0 & \bullet & * & \cdots & * & * & * & \cdots & * & * & * & \cdots & * \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \bullet & * & \cdots & * & * & * & \cdots & * \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & & & & \vdots & \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \bullet & * & \cdots & * \end{array} \right)_{k \times n} \\ O_{(m-k) \times n} \end{array} \right)$$

其中 \bullet 代表非零实数, $*$ 代表任意实数, 而 $k < n$.

证明. 根据定理 2.5, H 不确定当且仅当它的增广矩阵可通过第 I, II 类初等行变换化为

$$\left(\begin{array}{c} \left(\begin{array}{cccccccccccc} 0 & \cdots & 0 & \bullet & * & \cdots & * & * & * & \cdots & * & * & * & \cdots & * & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \bullet & * & \cdots & * & * & * & \cdots & * & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & & & & \vdots & \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \bullet & * & \cdots & * & 0 \end{array} \right)_{k \times (n+1)} \\ O_{(m-k) \times (n+1)} \end{array} \right)$$

且 $k < n$. \square .

由此我们得到一个重要的结论.

推论 2.8 设齐次线性方程组 (8) 中 $m < n$. 则该方程组有非平凡解.

证明. 设通过第 I, II 类初等行变换把该方程组的系数矩阵化为的阶梯型有 k 个非零行. 则 $k \leq m < n$. 由定理 2.7, 该方程组必有非平凡解. \square